

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ (FIV)

Η νόσος της επίκτητης ανοσοανεπαρκείας της γάτας (FIV) οφείλεται

σε ιό που ανήκει στους ρετροϊούς. Πρόκειται για νόσο που ανακαλύφθηκε

σχετικά πρόσφατα (1986) αν και υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία του ιού

από την δεκαετία του '60.

Πρόκειται για νόσο με παγκόσμια εξάπλωση που προσβάλλει γάτες

κάθε ηλικίας αν και η συμπτωματολογία της νόσου εμφανίζεται κυρίως σε ζώα

ηλικίας άνω των 6 ετών.

Οι γάτες που κινδυνεύουν περισσότερο από την μόλυνση είναι αυτές

που ζουν στο εξωτερικό περιβάλλον αφού η κυρία οδός μετάδοσης της νόσου

είναι τα τραύματα από δαγκώματα μεταξύ των δραστήριων σεξουαλικά ζώων.

Επίσης ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σπέρματος του μολυσμένου ζώου.

Η μόλυνση στα νεαρά γατάκια γίνεται κυρίως μέσω του θηλασμού.

Μετά την είσοδο του στον οργανισμό ο ιός εγκαθίσταται βασικά στους

λεμφαδένες. Η μόλυνση του ζώου παραμένει σε λανθάνουσα μορφή για αρκετά

χρόνια με αποτέλεσμα αυτό να μετατρέπεται σε ασυμπτωματικό φορέα. Δυ-

στυχως ο FIV διαθέτει μηχανισμούς που αποφεύγει την ανοσολογική απαντη-

ση στις γάτες με αποτέλεσμα να παραμένει εφ' όρου ζωής στις τελευταίες.

Η εκδήλωση της νόσου εμφανίζεται αρκετούς μήνες η και χρόνια μετά

την μόλυνση και χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες ευκαιριακές λοιμώξεις

και χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα. Η χρόνια ελκώδης στοματίτιδα είναι το συχνότερο σύμπτωμα. Στα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνονται η απώλεια βάρους, ο πυρετός, η λεμφογαγγλιομεγαλία, η πυώδης ρινίτιδα, η οξεία η χρόνια διάρροια, η φλυκταινώδης δερματίτιδα και οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναφέρονται και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως και η εμφάνιση νεοπλασμάτων.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται σε επίπεδο κτηνιατρείου με ειδικά τεστ

αίματος αλλά η οριστική και ασφαλής διάγνωση απαιτεί ειδικές μεθόδους.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική

για την νόσο. Η γάτα θα πρέπει να λαμβάνει την ανάλογη θεραπευτική αγωγή

για την οποιαδήποτε ασθένεια εμφανίζεται. Συνήθως χορηγούνται αντικα

φάρμακα σε συνδυασμό με αντιβιοτικά. Εμβόλιο κατά του ιού δεν κυκλοφορεί

στην Ελλάδα.

Η καλύτερη πρόληψη της νόσου είναι η αποφυγή περιπλάνησης των

ζώων μας και βασικά η στείρωση. Στείρωση πρέπει να διενεργείται και σε

όλα τα FIV θετικά ζώα για αποφυγή μολύνσεων. Η νόσος δεν μεταδίδεται

στον άνθρωπο.